

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

腎臟及泌尿系統：血尿、少尿、尿失禁、腎功能損害：

血液及淋巴系统:溶血症。

【禁忌】

- 1.对白蛋白有严重过敏者。
- 2.高血压患者、急性心脏病者、正常血容量及高血容量的心力衰竭患者。
- 3.严重贫血患者。
- 4.肾功能不全者。

【注意事项】

1.药液呈现浑浊、沉淀、异物或瓶子有裂纹、瓶塞松动、过期失效等情况不可使用。

2.本品为处方药,应在医生指导下使用,不得自行随意增减剂量。

3.本品为处方药,应在医生指导下使用,不得自行随意增减剂量。

4.有明显脱水者应同时补液。

5.运输及贮存过程中严禁冻结。

【孕妇及哺乳期妇女用药】

对孕妇或可能怀孕妇女的用药应慎重,如有必要应用时,应在医师指导和严密观察下使用。

【儿童用药】

尚不明确。

【老年用药】

尚不明确。

【药物相互作用】

本品不宜与血管收缩药、蛋白水解酶或含酒精溶剂的注射液混合使用。

【药物过量】

高渗作用,过量注射时,可能脱水,机体循环负荷增加,充血性心力衰竭和肺水肿。

【药理毒理】

增加血容量和维持血浆胶体渗透压,为临床上急救和治疗低血容量、血容量不足及休克等症。

本品为处方药,应在医生指导下使用,不得自行随意增减剂量。

本品为处方药,应在医生指导下使用,不得自行随意增减剂量。

本品为处方药,应在医生指导下使用,不得自行随意增减剂量。

本品为处方药,应在医生指导下使用,不得自行随意增减剂量。

本品为处方药,应在医生指导下使用,不得自行随意增减剂量。

本品为处方药,应在医生指导下使用,不得自行随意增减剂量。

本品为处方药,应在医生指导下使用,不得自行随意增减剂量。

本品为处方药,应在医生指导下使用,不得自行随意增减剂量。

本品为处方药,应在医生指导下使用,不得自行随意增减剂量。

本品为处方药,应在医生指导下使用,不得自行随意增减剂量。

本品为处方药,应在医生指导下使用,不得自行随意增减剂量。

本品为处方药,应在医生指导下使用,不得自行随意增减剂量。

本品为处方药,应在医生指导下使用,不得自行随意增减剂量。

本品为处方药,应在医生指导下使用,不得自行随意增减剂量。

本品为处方药,应在医生指导下使用,不得自行随意增减剂量。

本品为处方药,应在医生指导下使用,不得自行随意增减剂量。

本品为处方药,应在医生指导下使用,不得自行随意增减剂量。

本品为处方药,应在医生指导下使用,不得自行随意增减剂量。

本品为处方药,应在医生指导下使用,不得自行随意增减剂量。

本品为处方药,应在医生指导下使用,不得自行随意增减剂量。

本品为处方药,应在医生指导下使用,不得自行随意增减剂量。

本品为处方药,应在医生指导下使用,不得自行随意增减剂量。

本品为处方药,应在医生指导下使用,不得自行随意增减剂量。

本品为处方药,应在医生指导下使用,不得自行随意增减剂量。

本品为处方药,应在医生指导下使用,不得自行随意增减剂量。

本品为处方药,应在医生指导下使用,不得自行随意增减剂量。

本品为处方药,应在医生指导下使用,不得自行随意增减剂量。

本品为处方药,应在医生指导下使用,不得自行随意增减剂量。

本品为处方药,应在医生指导下使用,不得自行随意增减剂量。

本品为处方药,应在医生指导下使用,不得自行随意增减剂量。

本品为处方药,应在医生指导下使用,不得自行随意增减剂量。

本品为处方药,应在医生指导下使用,不得自行随意增减剂量。

本品为处方药,应在医生指导下使用,不得自行随意增减剂量。

本品为处方药,应在医生指导下使用,不得自行随意增减剂量。

本品为处方药,应在医生指导下使用,不得自行随意增减剂量。

本品为处方药,应在医生指导下使用,不得自行随意增减剂量。