

人免疫球蛋白说明书

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

传播的可能。临床使用时应权衡利弊。

【药品名称】

通用名称: 人免疫球蛋白

英文名称: Human Immunoglobulin

汉语拼音: Rén Mianyi Qiu Dan Bai

【成份】

主要成份为人免疫球蛋白。本品系由健康人血浆, 经低温乙醇蛋白分离法与层析法分离纯化, 并经低 pH (pH4.0) 病毒灭活和DV50 pH4纳米膜过滤处理制成。不含防腐剂或抑菌剂, 不含动物源性和/或人源成分。

性状

【性状】

应为无色或淡黄色澄清液体, 可带乳光, 不得出现

不良反应的监测资料。少数人会出现

皮疹、疼痛反应, 充分将尿处理, 可自行

此药主要供治疗和预防使用。

【规格】

300mg/瓶 (3% 3ml)

600mg/瓶 (6% 3ml)

【用法用量】

用法: 只限于肌肉注射, 不得用于静脉输注

用量: 遵医嘱。

预防麻疹: 为预防发病或减轻症状, 可在

接触7日内按每公斤体重注射0.05

5ml者注射1.5~3.0ml, 6岁以上儿童

超过6ml。一次注射预防效果通常

【不良反应】

尚存积累和延迟

反应等

【禁忌】

于抗体与抗原相互作用起到直接中和毒素与杀灭细

2. 有IgA抗体的选择性IgA缺乏者。

感染有一定的作用。

【注意事项】

毒理研究，尚不清楚。

3. 运输及贮存过程中严禁冻结。

【贮藏】

【孕妇及哺乳期妇女用药】

于2~8℃避光保存和

未专门进行该项针对性试验研究，且无系统可靠的

【包装】

《中国药典》2025年版三部和YBS00252013

未专门进行该项针

【批准文号】

参考文献。

国药准字S20063021：300mg/瓶

【药物相互作用】

免疫球蛋白有相互作用的药物可

国药准字S20063020：150mg/瓶

应单独使用。凡

相互作用。

【药品上市许可持有人】

能会对本品产生

博晖生物制药(河北)有限公司

【药物过

变异反应和因剂量大在注射部位造成疼

【生产企业】

可能产生

企业名称：博晖生物制药(河北)有限公司

痛感。

生产地址：石家庄市鹿泉绿岛头槐开发区青山路6号

【药理毒

是把免疫球蛋白内含有的大量抗体输给受者，使之

电话号码：0311-83935518

从低或无免疫状态很快达到暂时免疫保护状态。由